



# SYSTEM KOMUNIKATÓW SADOWNICZYCH

## KOMUNIKAT SKS 5 2018-04-23

### UPRAWY ZIARNKOWE: jabłoń, grusza

#### PARCZ JABŁONI

Uwaga jeżeli potwierdzą się prognozy pogody to od poniedziałku po południu możliwe są opady deszczu i pierwsze znaczące wysiewy zarodników workowych w tym sezonie. W niektórych rejonach mogą mieć one postać intensywnych opadów burzowych. Dlatego w najbliższym czasie polecamy wykonanie zabiegu zapobiegawczego. Jednym z lepszych rozwiązań na ten moment są produkty **Delan 700 WG (0,7 kg/ha)** lub **Delan Pro (2,5 l/ha)**. Środki zawierające ditianon doskonale pokrywają tkankę roślinną i zabezpieczają ją na długi czas. Dla wydłużenia działania w niższych temperaturach i zabezpieczenia tkanek również od wewnątrz można zastosować łącznie produkt **Delan 700 WG (0,5 kg/ha)** i **Batalion 450 SC (1 L/ha)**.

#### MĄCZNIAK JABŁONI

Coraz więcej sygnałów z kraju dociera o dużej presji ze strony mączniaka. Dla przypomnienia zgodnie z zaleceniami z poprzednich komunikatów SKS proponujemy użycie produktu **Kendo 50 EW w dawce 0,4 l/ha** lub **Fontelis 200 SC w dawce 0,5 l/ha**. Drugi z produktów wykazuje również działanie zapobiegawcze i interwencyjne w stosunku do parcha jabłoni dzięki czemu użycie tego środka byłoby uzasadnione w przypadku jednoczesnego zwalczania obu chorób grzybowych zwłaszcza w obliczu spodziewanego na poniedziałek zagrożenia ze strony parcha jabłoni.

#### ZWÓJKI LIŚCIOWE i MSZYCE

W sadach w których obserwuje się pojawienie gąsienic zwójek liściowych lub mszyc konieczne będzie zastosowanie odpowiednio produktu **Runner 240 SC w dawce 0,4 l/h (zwójki)** oraz **Mospilan 20 SP w dawce 0,125 kg/ha** lub **Apis 200 SE 0,125 l /ha (mszyce)**. W sadzach jest już bardzo dużo owadów pożytecznych m.in. pszczoł dlatego należy stosować środki o selektywnym działaniu najlepiej późnym wieczorem po oblocie owadów zapylających.

#### PRZĘDZIOREK OWOCOWIEC

W sadach gdzie stwierdzono obecność przędziorków i został przekroczony próg szkodliwości (3 formy ruchome w próbie 200 liści, po jednej rozecie z 40 losowo wybranych drzew), należy wykonać zabieg zwalczający preparatem, np. **Ortus 05 SC w dawce 1,25-1,5l/ha**, produkt ten należy do grupy (Inhibitorów mitochondrialnego transportu elektronów) – zwalcza wszystkie ruchome stadia roztoczy.

#### POPRAWA ZAWIĄZYWANIA

Zastosowanie GA4+7 w początkowym okresie kwitnienia, w znacznym stopniu wydłuża żywotność komórek jajowych, zwiększając szanse na zapłodnienie. Taki zabieg jest szczególnie ważny dla odmian z grupy Jonagolda - pierwszy oprysk należy wykonać na późny różowy pąk, gdy pierwsze kwiaty królewskie zaczynają się rozwijać, zabieg GA4/7 **Novagib 010 SL (1% substancji aktywnej) w dawce 0,5 litra**. Oprysk należy powtórzyć przy bardzo słabym kwitnieniu. Zabieg ten należy wykonać w temperaturze powyżej 16°C.

SKS 5 2018 Parch zabezpieczająco: Delan 0,7kg / Delan Pro 2,5L, ewentualnie Delan 0,5kg + Batalion 1L, Macznik: Kendo 0,4L / Fontelis 0,5L Zwojki: Runner 0,4L Mszyce: Apis 0,125L Przedziorki: Ortus 05SC 1,5L Poprawa zawiązywania: Novagib 0,5L  
[www.fruitakademia.pl/wp-content/uploads/2018/03/SKS\\_5\\_2018.pdf](http://www.fruitakademia.pl/wp-content/uploads/2018/03/SKS_5_2018.pdf)