



SYSTEM KOMUNIKATÓW SADOWNICZYCH

KOMUNIKAT SKS 8 2018-04-30

UWAGA OPADY GRADU

W rejonach gdzie wystąpiły opady gradu wskazane jest wykonanie zabiegów mających na celu zabezpieczenie ran. Jednym z rozwiązań jest **Topsin M 500 SC w dawce 1,5 l/ha** lub środki zawierające kaptan w dawce 1,9 kg/ha. Regenerację można również wspomóc poprzez zastosowanie produktów zawierających aminokwasy m.in. **Naturamin WSP w dawce 0,5 - 1 kg/ha** lub **Megafol 2-3 l/ha**.

OGRANICZENIE SIŁY WZROSTU DRZEW

Na odmianach u których na końcach jednorocznych pędów są już wykształcone 4-6 liście w rozetach, wskazane jest zastosowanie retardantów wzrostu, **Kudos/ Regalis Plus 10WG**. Dawka powinna być uzależniona od siły wzrostu drzew. Znacznie lepsze działanie wykazuje aplikacja dawkami dzielonymi np. 2 aplikacje po 1,25 i 0,75kg/ha oraz ostatnia w przypadku konieczności na odmianach silnie rosnących 0,5 kg/ha. Łącznie nie więcej jak 2,5 kg/ha.

ZARAŻA OGNIOWA

Okres końca kwitnienia i intensywnego przyrostu młodych pędów jest najbardziej newralgiczny pod względem możliwości infekcji kwiatów i młodych tkanek przez bakterie *Erwinia amylovora*. Dlatego w sadach w których w ubiegłym roku obserwowano objawy zarazy wskazane jest zastosowanie produktów zawierających miedź np. **Miedzian 50 WP w dawce 0,75 kg/ha**. Zastosowanie Regalis-u w celu skrócenia pędów ma również pozytywny wpływ na ograniczenie występowania zarazy ogniowej w kwaterach gruszy.

PARCZ JABŁONI - PRZYPOMNIENIE

Opady deszczu jakie miały miejsce na terenie naszego kraju wczoraj (29.04) doprowadziły do wysiewu zarodników workowych i infekcji na różnym poziomie w zależności od lokalizacji:

Słabych: Budziszyniek, Dąbrowice lub **średnich infekcji:** Biała Rawska, Borowe, Branków, Komorów, Konary, Linin, Niemojewice, Nowa Wieś, Paprotnia, Pilica, Płońsk Wandalin i Wilków.

Kolejne opady deszczu możliwe będą jeszcze dziś wieczorem (30.04) dlatego w sadach w których minęło 3-4 dni od ostatniego zabiegu lub spadł obfity deszcz konieczne będzie wykonanie zabiegu chociażby zapobiegawczego z użyciem produktów m.in.: **Delan 700 WG (0,5-0,75 kg/ha)**, **Kaper 80 WG/Lekaro 80 WG (1,9 kg/ha)**. Interwencyjnie wytyczne zawarte w SKS 7 z poprzedniego tygodnia, gdzie opisano 4 rozwiązania systemowe traktujące kompleksowo temat zwalczania parcza na obecny czas.

MIODÓWKA GRUSZOWA

Jeśli lustracja w sadzie wykaże dużą liczebność larw, po kwitnieniu zalecany jest zabieg jednym z preparatów: **Apacz 50 WG (0,15 kg/ha)**, **Acaramik 018 EC (0,75 l/ha)**, Dimilin 480 SC (0,375 l/ha) lub Movento 100 SC (2,25 l/ha).

SKS 8 2018 Grad: Topsin 1,5L + Naturamin 0,5-1kg lub Megafol 2-3L; Ograniczenie wzrostu: Kudos/Regalis dawki dzielone - 1) 1,25kg, 2) 0,75 kg, 3) 0,5 (na odm. silnie rosnących); Zaraza ogniowa: Miedzian 0,75kg; Parcz wysiewy: a) zapobiegawczo Delan 0,5-0,75kg lub Kaper/Lekaro 1,9kg lub ThiuramGranuflo 3kg; b) interwencyjnie: kontakt + np. Cyprodex 0,5L lub Zato 0,15kg

www.fruitakademia.pl/wp-content/uploads/2018/04/SKS_8_2018.pdf